

Sammelbericht aus Ostpreußen.

Von

G. Vorbringer in Königsberg.

Nachstehend gebe ich wieder ein Verzeichnis von für Ostpreußen neuen* resp. durch ihre Seltenheit bemerkenswerten Käfern. Die angeführten Fundorte liegen alle in der Umgegend von Königsberg, nur das mehrfach erwähnte Schillinnen bei Goldap. — Es erübrigt mir noch, den Herren Bernhauer, Reitter, Weise, Schultze, Pape für Revision zweifelhafter Arten meinen besten Dank zu sagen.

Dromius cordicollis Vorbg. — 1 Ex. Schillinnen s. s.

Diachromus germanus L. — 1 Ex. Schillinnen s. s.

Trachys troglodytes Gyll. — 1 Ex. Schillinnen s.

**Byrrhus fasciatus* F. var. *subornatus* Reitt. — Von Schilsky als fraglich für Deutschland aufgeführt. 3 Ex. Schillinnen (von Reitter bestimmt!).

Epuraea nana Reitt. — 1 Ex. Schillinnen s. s., bisher aus Ostpr. nur 1 Ex. bekannt (Czwalina handschriftl.).

**Meligethes ovatus* Sturm. — 2 ♂ Glacis, 1 ♂ Schillinnen.

**Laemophloeus corticinus* Er. — 1 Ex. Schillinnen s. s.

Silvanus similis Wasm. — Diesen in Ostpr. s. s., bisher nur in 2 Ex. bekannten Käfer fand ich in Mengen in Schillinnen unter modernden Fichtenzeigen zusammen mit *Atomaria turgida* u. *Lathridius rugicollis*, beide ebenfalls in Menge.

**Enicmus fungicola* Thoms. — 1 Ex. Königsberg, Wilhelmspark s. s.

**Telmatophilus Schönherrii* Gyll. — 1 Ex. Fischhausen, in Steiner's Sammlung 1 Ex. Neuhausen.

**Bythinus Stufsineri* Reitt. — 1 Ex. Gr. Raum, neu für Nordd. (von Reitter bestimmt!).

**Stenus flavipalpis* Thoms. — 2 Ex. Königsberger Glacis, 1 Ex. Rauschen, 1 Ex. Warnicken, 1 Ex. Schillinnen, auch von Czwalina in Rauschen gefunden (handschriftl.). Von Schilsky nur aus Tirol und Hessen angeführt.

**Stenus excubitor* Er. — 1 Ex. Schillinnen.

**Quedius boops* Grav. var. *fallaciosus* Kr. — 1 Ex. Neuhausen, von Schilsky nur für die Mark angeführt.

Quedius obliteratus Er. — 3 Ex. Schillinnen s. s., aus Ostpr. bisher nur 1 Ex. bekannt.

**Liogluta brunnea* F. — 1 Ex. Königsberg Glacis.

**Liogluta rufotestacea* Kr. — 1 Ex. Gr. Raum.

**Liogluta microptera* Thoms. — 1 ♂ Schillinnen. Für Norddeutschland neu nach Schilsky.

**Homalota clancula* Er. — 1 Ex. Gr. Raum. Für Norddeutschland neu nach Schilsky.

**Homalota fallax* Kr. — 1 Ex. Fischhausen.

**Placusa atrata* Sahlb. — 1 Ex. Königsberg, Holzgarten.

**Oxypoda planipennis* Thoms. — 1 Ex. Gr. Raum.

**Oxypoda Skalitzkyi* Bernh. (von ihm selbst bestimmt!). — 1 Ex. Schillinnen. Diese Art ist von Bernhauer neuerdings beschrieben, die Verbreitung in Deutschland ist mir unbekannt.

**Ernobius tabidus* Kiesw. — 1 Ex. Schillinnen s. s.

Cyrtanaspis phalerata Germ. — 1 Ex. Schillinnen s. s. Aus Ostpreußen bisher nur 1 Ex. bekannt.

**Anaspis ruficollis*. — 2 Ex. Schillinnen.

Otiorkhynchus lepidopterus F. — Für Ostpreußen bisher zweifelhaft. Bei Schillinnen häufig auf jungen Birken, scheint viel verbreiteter zu sein als in der Literatur angegeben; z. B. verzeichnet ihn Seidlitz nur in Lappland und im südlichen Europa.

**Dorytomus flavipes* Panzer. — Neue Bleiche 2 Ex.

**Bugous tempestivus* Herbst var. *tessellatus* Förster. — Schiefspl. 1 Ex.

**Rhyncholus elongatus* Gyll. — 1 Ex. bei Königsberg.

**Rhyncholus turbatus* Sch. — 2 Ex. Schweizerthal. Ueber das Vorkommen sagt Seidlitz: im nördlichen Europa in Schweden und Finnland, die weitere Verbreitung unbekannt; Schilsky gibt Rheinl. an, Reitter sagt in ganz Europa (?) aber ziemlich selten.

**Coeliodes ruber* Marsh. — 7 Ex. Rauschen, 2 Ex. Metgethen.

Ceutorhynchus Sahlbergi (Bestimmung von Schultze bestätigt). — 1 Ex. Holsteiner Wiesen bei Königsberg. Aus Deutschland wohl nur der ältere Fund von Kramer-Gilgenburg O/Pr. bekannt, außerdem Ungarn, Kaukasus, überall nur vereinzelt.

Ceutorhynchus Javeti Bris. — 1 Ex. Schillinnen s. s.

**Ceutorhynchus Moelleri* Thoms. (= *rotundatus* Bris.). — 1 Ex. Rauschen, von Schultze bestimmt; aus Deutschland wohl nur von Bayern bekannt, Verbreitungszentrum nach Schultze Balkangebiet.

**Ceutorhynchus hirtulus*. — 1 Ex. Eichenkrug, in Steiner's Sammlung 1 Ex. Neuhäuser.

**Miarus micros* Germ. — 1 Ex. Ludwigsort.

**Bruchus rufipes* Herbst. — 1 Ex. Dammkrug, von Reitter bestimmt, fehlt nach Schilsky in Nordd.

**Bruchus marginalis* F. — 1 Ex. Schillinnen.

Lochmaea suturalis Thoms. — Metgethen 2 Ex., nach Seidlitz nur bis Westpr., nach Czwalina (handschr.) häufig, wohl öfters übersehen.

Saperda Phoca Fröhl. — 1 Ex. Schillinnen s. s.

Ueber *Dromius cordicollis* Vorbg.

Von

G. Vorbringer in Königsberg.

Obiger, von mir in den Entomol. Nachrichten 1898 S. 286/7 als neu beschriebene Käfer wurde seitdem in einem zweiten Exemplar von Dr. Bercio bei Insterburg gefunden, in einem dritten von mir bei Schillinnen O/Pr. (siehe vorstehenden Sammelbericht).

Vor einigen Monaten nun erhielt ich von Hrn. W. Masaraki in Petersburg ein Exemplar desselben Käfers aus der Umgegend von Petersburg, welches vortrefflich mit meiner Type übereinstimmt. Zugleich machte Herr Masaraki mir die Mitteilung, daß der Käfer von ihm sowie den Herren Barowski und Jacobson in den letzten Jahren in 9 Exemplaren, alle in der Umgegend von Petersburg, aufgefunden worden. Ferner schreibt mir Herr Masaraki noch folgendes:

„Im Katalog der Insekten des Mogilew'schen Gouvernements (West-Rußland) von N. Arnold 1902 ist unter *Drom. fenestratus* F. zu lesen: — *elytris immaculatis, certe non Dr. agilis var. obscurus*